

PREPARACIÓN PARA REALIZAR UNA BIOPSIA DE PRÓSTATA**LUGAR:**

Pº Reina Elisenda, 17. 08034 Barcelona. TELF. 932.522.522

MEDICACIÓN NECESARIA:

Enema Casen 250cc. 2 envases.
Ciprofloxacino 500 mg suspensión sobres o pastillas.
Metronidazol 250mg. 8 comprimidos (FLAGYL).

En caso de alergia puede sustituir Ciprofloxacino y Metronidazol por Amoxicilina+Clavulánico.

Si está con tratamiento anticoagulante:

Aspirinas, Tromalyt, Disgren: dejarlo 3 días antes de la prueba.

Plavix, Iscover, Ticlid: dejarlo 7 días antes de la prueba.

Sintrom: pasar previamente por el servicio de Hematología de su centro.

DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA:

Por la noche se pondrá un Enema Casen de 250cc.

DÍA DE LA PRUEBA:

Tratamiento antibiótico:

- **Ciprofloxacino 500 mg suspensión sobres. 1 sobre/pastilla cada 8 horas.**
- **Metronidazol 250mg. 2 comprimidos cada 12 horas.**

Iniciar tratamiento antibiótico a las 9 de la mañana.

No comer, ni beber nada desde 6 horas antes de la exploración.

Al levantarse se pondrá un **Enema Casen de 250cc.**

Deberá aportar pruebas de coagulación (Protrombina y Cefalina).

DESPUÉS DE LA PRUEBA:

Tratamiento antibiótico:

- **Ciprofloxacino 500 mg suspensión sobres/pastillas. 1 sobre/pastilla cada 8 horas. Tres días más.**
- **Metronidazol 250mg. 2 comprimidos cada 12 horas. Un día mas.**

- Evitar el reposo absoluto.
- Dieta normal a partir de las 4-6 horas posterior a la sedación.
- Acudir acompañados.
- Si molestias o dolor: Ibuprofeno 600 mgrs cada 12 horas.

- Es normal el sangrado rectal y por la orina durante los 2 primeros días. En caso de persistencia, o sangrado no controlado así como fiebre superior a 38º acudir a urgencias o llamar al teléfono de atención urgente de nuestro centro.
- Es normal la persistencia de semen negro u oscuro a los 7 días tras biopsia de próstata.